404882

Sr^{90} in Land Plants
Collected at Eniaetok - March 1958
(Exclusive of pandanus)

Sample	Sample No.	Sr^{90} d/m/g/dry	Sr^{90} d/m/g/wet	mg Ca / gm dry sample	μμc Sr^{90} / gm Ca	Limit of detectability
Tacca Corm peelings	R-122B	21.4 ± 2.4	3.9 ± 0.4	5.261	1900	
Cucurbita Fruit Meat	R-108	35.1 ± 1.7	5.5 ± 0.27	5.943	2700	
Fimbristylis Leaves	R-116	62.3 ± 2.6	27.8 ± 1.1			
Morinda Leaves	R-118	138.4 ± 6.0	21.0 ± 0.41			
" "	R-105	99.6 ± 4.1	18.3 ± 0.76			
Cucureita, fruit meat (squash)	R-110	4.8 ± 1	0.7 ± 0.1	5.94	360	
Cucureita, seed pulp	R-109	not detectable	6.505	0		0.3 d/m/g wet
Tacca, corn peeled	R-122c	not detectable	not detectable	1.845		0.1 d/g/wet
Cassytha, whole plant	R-120	3.4 ± 0.5	0.7 ± 0.1	19.5	79	

LABORATORY OF RADIATION BIOLOGY
UNIVERSITY OF WASHINGTON
SEATTLE 5, WASHINGTON

DOE ARCHIVES